

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 8-11-76334349

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

Téléphone : 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux
93, RUE DE CURAMBOURG
45400 FLEURY LES AUBRAIS
C. C. P. : La Source 4604-25 C

BULLETIN TECHNIQUE N° 117

29 OCTOBRE 1976

DESHERBAGE COMPLEMENTAIRE DU COLZA

COLZA

A la suite d'un été particulièrement sec, le déchaumage réalisé après céréales n'a pas eu son efficacité habituelle dans la destruction des adventices. Les pluies récentes, malgré l'utilisation d'herbicides de présemis, ont permis dans certains secteurs l'apparition d'importantes repousses de céréales.

Dans les parcelles fortement envahies, un désherbage complémentaire peut s'avérer nécessaire. Il ne pourra être réalisé que si l'état végétatif de la culture est satisfaisant. Deux produits sont actuellement utilisables :

! MATIERE ACTIVE !(Produit commercial)	! DOSE/HA !		! PERIODE D'APPLICATION !	! SPECTRE D'ACTIVITE !
	! MA !	! PC !		
! PROPYZAMIDE	! 500 g !	! 1 kg !	! du stade 4 feuilles	! les graminées, les repousses de céréales et quel-
	!	!	! vraies de la culture jus-	! ques dicotylédones : re-
	!	!	! jusqu'à la fin de l'hiver	! nouée, renoncule, véro-
! (Kerb 50)	!	!	!	! nique, stellaire.
! CARBETAMIDE	! 2000g !	! 2,8kg !	! du stade 4 feuilles	! les graminées et les
	!	!	! vraies de la culture et	! repousses de céréales
! (Legurame PM)	!	!	! jusqu'à la reprise de	!
	!	!	! végétation	!

MA = Matière Active

PC = Produit Commercial

Le DALAPON, utilisable en intervention précoce, est maintenant déconseillé car il sensibilise le colza au froid. Les autres produits de postlevée sont eux aussi à éviter en traitement complémentaire car ils risquent d'entraîner des phénomènes de phytotoxicité.

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

CEREALES

Depuis notre dernier bulletin (n° 116), la situation a peu évolué : les populations du puceron Rhopalosiphum sont peu importantes sur escourgeon et orge d'hiver.

REMANENCE D'HERBICIDES

Après l'été sec, comme derrière maïs, des résidus d'herbicides peuvent provoquer des accidents sur blé derrière betterave. Dans les cas où ce risque est à craindre, il est conseillé d'effectuer un labour profond, de ne pas retarder le semis et dans les parcelles peu envahies par les adventices, d'éviter un désherbage du blé en prélevée. Certains produits utilisés sensibilisent la céréale à ces résidus d'herbicides : CHLORTOLURON, METHABENZTHIAZURON, NEBURON et TERBUTRYNE.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

C. de la MESSELIERE

B. LELIEVRE

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire "CENTRE"

G. BENAS